


➤ Sérologie CMV chez la femme et chez le femme enceinte – HAS Juin 2025

L'infection à cytomégalo virus est bénigne dans la majorité des cas. Cependant si elle est développée pendant la grossesse, notamment pendant la période encadrant le début de grossesse, elle peut provoquer chez le bébé des séquelles lourdes (troubles auditifs – développement cérébral)

La HAS recommande dorénavant un dépistage systématique chez la femme enceinte.

Stratégies diagnostiques et intérêt d'un dépistage anté-natal



➤ VS – HAS Novembre 2025

La HAS a évalué la pertinence de la mesure de VS dans plusieurs situations cliniques :

- Bilan de routine chez les patients asymptomatiques
- Artérite à cellules géantes
- Pseudo Polyarthrite rhizomélisque
- Lupus systémique
- Polyarthrite rhumatoïde
- Arthrite juvénile idiopathique
- Lymphome de Hodgkin
- Myélome multiple

La HAS considère que la mesure de la VS n'a pas démontré d'intérêt médical dans ces indications.

➤ Numération plaquettaire sur tube citrate

Cet examen est indiqué uniquement en cas d'agrégats plaquettaires sur EDTA.

Seul le citrate CTAD est recevable car non-toxique pour les plaquettes.

➤ IST

Dorénavant *Mycoplasma hominis* et *Ureaplasma urealyticum* sont considérés comme non pathogènes.

En revanche *Mycoplasma genitalium* doit être recherché en cas de symptômes d'urétrite chez l'homme ou de cervicite chez la femme.

Cette recherche est réalisée en association avec la recherche de *Chlamydia trachomatis* et *Neisseria gonorrhoeae* par PCR et sans surcoût (B85)

Chez l'homme, privilégier le prélèvement urinaire et chez la femme, le prélèvement vaginal.